

# PROTIFERT 8,5 % organische N

**Gewaarborgde samenstelling : 8,5% organische N** , afkomstig van aminozuren , die de bouwstenen zijn voor de aanmaak van proteïnen (= eiwitten), koolhydraten (suikers, zetmeel), vele celbestanddelen, fytohormonen , vitaminen enz... PROTIFERT bevordert de bloemaanleg, de vruchtzetting enz...  
Totale hoeveelheid vrije aminozuren : **13%**                      Totale hoeveelheid organische koolstof (C) : **24%**

- Werking** : - **enzymatische hydrolyse** , dus geen vervorming van de oorspronkelijke aminozuur-ketens
- **snelle werking** dankzij de direct opneembare aminozuren
  - **betere weerstand tegen perioden van stress (waardoor energie gespaard wordt !)** : koude , droogte , donker weer, overvloedige neerslag, schade van fyto enz ...
  - **betere hechting** van de op het bladoppervlak aangebrachte oplossing ⇒ géén uitvloeier nodig
  - **synergisme** : het versterkt de werking van de fyto-producten (mengbaar met alle fyto-producten )

TEELTEN	AANBEVOLEN DOSIS ( liter / ha)	PERIODE VAN AANBRENGEN
Serreteelt ( tomaat , komkommer, courgette)	300 à 500 ml / 100 lit. water	Om de 14 dagen gedurende de groeicyclus
Aardbeien	3 à 4 keer , telkens 2 à 3 l/ha	Om de 2 weken , vanaf de vegetatieve hergroei tot de vruchtzetting // bij heruitplanten : wortels onderdompelen in 1%-oplossing (+/- 1 u.)
Aardappelen      vroege late	5 keer , telkens 2 l/ha 10 keer , telkens 1 l/ha	Om de 1 à 2 weken , vanaf de knolaanleg (= meestal 6 weken na planten)
Suikerbieten	3 à 4 keer , telkens 1 à 1,5 l/ha	Tijdens het toepassen van het FAR-systeem tot de fungiciden-behandeling (juni, juli)
Maïs	1 keer x 3 l/ha	In 4- à 5-bladstadium (10 cm hoog)
Granen	3 keer x 1 l/ha	Vanaf als het graan hergroeit + in juni ( bij de fungicidenbehandeling)
Bonen	4 keer x 2 l/ha	Telkens als men spuit tegen bvb. sclerotiniarot
Spinazie	2 keer x 4 à 5 l/ha	In jong stadium, groeit maar 6 weken
Spruitkool	5 à 6 keer , telkens 1,5 à 2 l/ha (met de fungiciden)	Om de 14 dagen , vanaf als de plant 20 cm hoog is (+ tot in september)
Bloemkool	4 à 5 keer , telkens 1,5 à 2 l/ha	2 weken na het planten beginnen en dan om de 14 dagen toedienen
Prei	4 à 5 keer, telkens 1,5 à 2 l/ha	Om de 2 weken , vanaf als de prei goed begint op te komen + heel het najaar en winter door !!
Appel/Peer	4 à 5 keer , telkens 1,5 à 2 l/ha (met de fungiciden)	Bij elke bespuiting , vanaf bloembot tot einde juli
Boomkwekerijen en sierplantenteelt	4 à 5 keer , telkens 2 à 3 l/ha	Gedurende het ganse groeiseizoen (van april tot augustus)

**Uw verdeler :**